Strensiq® Voice over script e immagini per la guida animata all'autoiniezione disponibile sul sito: asfotasealfa-materialeeducazionaleperilpaziente.it

Rimuova il tappo di protezione dal flaconcino per scoprire la guarnizione in gomma sterile.
Inserisca l'ago da siringa con il calibro più grande nella siringa vuota e con il tappo protettivo ancora inserito, spinga in basso e giri in senso orario l'ago nella siringa affinché sia ben posizionato.
Rimuova il tappo in plastica che ricopre l'ago della siringa.
Tiri lo stantuffo fino a riempire la siringa di una quantità di aria pari alla dose prescritta.
Tenendo la siringa e il flaconcino, inserisca l'ago nella guarnizione in gomma sterile.
Prema completamente lo stantuffo in modo da iniettare l'aria all'interno del flaconcino.
Capovolga il flaconcino e la siringa. Con l'ago immerso nella soluzione tiri lo stantuffo fino a estrarre la dose corretta nella siringa.
Prima di rimuovere l'ago dal flaconcino, verifichi che nella siringa non vi siano bolle d'aria.
Qualora fossero presenti, picchietti delicatamente il lato della siringa finché le bolle non salgono verso la parte superiore.
Quando tutte le bolle sono salite in alto, prema delicatamente sullo stantuffo per farle uscire dalla siringa e farle rientrare nel flaconcino.
Quindi, controlli la dose del farmaco nella siringa per essere certo di averne estratto la quantità corretta.
Rimuova l'ago dal flaconcino e riposizioni il cappuccio protettivo sull'ago, come spiegatole dal suo medico.
Rimuova l'ago con il cappuccio protettivo applicato e di calibro più grande dalla siringa, spingendo in basso e girando in senso anti-orario e lo getti nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti
Inserisca l'ago con il calibro più piccolo sulla siringa già riempita e, con il tappo ancora inserito, spinga in basso e giri in senso orario l'ago nella siringa affinché sia ben posizionato. Tolga il tappo protettivo e lo getti nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.
Tenga la siringa con l'ago rivolto verso l'alto e tocchi il corpo della siringa con il dito per rimuovere le bolle d'aria. Una volta eliminate le bolle d'aria, controlli la dose del medicinale nella siringa per assicurarsi di avere prelevato la quantità corretta. Ora può procedere all'iniezione della dose corretta.
Scelga e prepari il sito di iniezione: strofini la cute con una salviettina sterile imbevuta di alcool. Esegua un movimento a spirale dal centro del sito di iniezione verso l'esterno, e non torni sulla pelle già disinfettata. Aspetti che si asciughi all'aria.
Stringa delicatamente la pelle nell'area di iniezione tra il pollice e l'indice.
Afferri la siringa come una penna o una freccetta, quindi inserisca l'ago nella pelle sollevata a un'angolazione compresa tra 45° e 90° verso la superficie cutanea.
Continuando a stringere la pelle, prema fino in fondo lo stantuffo della siringa in modo da iniettare il farmaco clentamente e costantemente.
Rimuova l'ago, rilasci la pelle e appoggi delicatamente un batuffolo di cotone o una garza sul sito di iniezione per qualche secondo. Non massaggi la sede di iniezione dopo l'iniezione.
Se necessario, applichi un piccolo cerotto o una benda adesiva sul sito di iniezione.
Getti la siringa, il tappo e il flaconcino usati nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.
Se è necessaria una seconda iniezione per somministrare la dose prescritta, prenda un altro flaconcino di Strensiq e ripeta le precedenti fasi.
Registri tutte le informazioni relative all'iniezione sul diario o mediante altri strumenti.

Iniezioni di Strensiq®

Rimuova il tappo di protezione dal flaconcino per scoprire la guarnizione in gomma sterile.

Iniezioni di Strensiq®

Inserisca l'ago da siringa con il calibro più grande nella siringa vuota e con il tappo protettivo ancora inserito, spinga in basso e giri in senso orario l'ago nella siringa affinchè sia ben posizionato.

Iniezioni di Strensiq®

Inserisca l'ago da siringa con il calibro più grande nella siringa vuota e con il tappo protettivo ancora inserito, spinga in basso e giri in senso orario l'ago nella siringa affinchè sia ben posizionato.

Iniezioni di Strensiq®

Rimuova il tappo in plastica che ricopre l'ago della siringa.

Iniezioni di Strensiq®

Tiri lo stantuffo fino a riempire la siringa di una quantità di aria pari alla dose prescritta.

Iniezioni di Strensiq®

Tenendo la siringa e il flaconcino, inserisca l'ago nella guarnizione in gomma sterile.

Iniezioni di Strensiq®

Prema completamente lo stantuffo in modo da iniettare l'aria all'interno del flaconcino.

Iniezioni di Strensiq®

Capovolga il flaconcino e la siringa. Con l'ago immerso nella soluzione, tiri lo stantuffo fino a estrarre la dose corretta nella siringa.

Iniezioni di Strensiq®

Prima di rimuovere l'ago dal flaconcino, verifichi che nella siringa non vi siano bolle d'aria.

Iniezioni di Strensiq®

Qualora fossero presenti, picchietti delicatamente il lato della siringa finché le bolle non salgono verso la parte superiore.

Iniezioni di Strensiq®

Quando tutte le bolle sono salite in alto, prema delicatamente sullo stantuffo per farle uscire dalla siringa e farle rientrare nel flaconcino.

Iniezioni di Strensiq®

Quindi, controlli la dose del farmaco nella siringa per essere certo di averne estratto la quantità corretta.

Iniezioni di Strensiq®

Rimuova l'ago dal flaconcino e riposizioni il cappuccio protettivo sull'ago, come spiegatole dal suo medico.

Iniezioni di Strensiq®

Rimuova l'ago con il cappuccio protettivo applicato e di calibro più grande dalla siringa, spingendo in basso e girando in senso anti-orario e lo getti nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Rimuova l'ago con il cappuccio protettivo applicato e di calibro più grande dalla siringa, spingendo in basso e girando in senso anti-orario e lo getti nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Inserisca l'ago con il calibro più piccolo sulla siringa già riempita e, con il tappo ancora inserito, spinga in basso e giri in senso orario l'ago nella siringa affinchè sia ben posizionato.

Iniezioni di Strensiq®

Tolga il tappo protettivo e lo getti nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Tolga il tappo protettivo e lo getti nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Tenga la siringa con l'ago rivolto verso l'alto e tocchi il corpo della siringa con il dito per rimuovere le bolle d'aria. Una volta eliminate le bolle d'aria, controlli la dose del medicinale nella siringa per assicurarsi di avere prelevato la quantità corretta. Ora può procedere all'iniezione della dose corretta.

Iniezioni di Strensiq®

Scelga e prepari il sito di iniezione: strofini la cute con una salviettina sterile imbevuta di alcool. Esegua un movimento a spirale dal centro del sito di iniezione verso l'esterno, e non torni sulla pelle già disinfettata. Aspetti che si asciughi all'aria.

Iniezioni di Strensiq®

Stringa delicatamente la pelle nell'area di iniezione prescelta tra il pollice e l'indice.

Iniezioni di Strensiq®

Afferri la siringa come una penna o una freccetta, quindi inserisca l'ago nella pelle sollevata a un'angolazione compresa tra 45° e 90° verso la superficie cutanea.

Iniezioni di Strensiq®

Continuando a stringere la pelle, prema fino in fondo lo stantuffo della siringa in modo da iniettare il farmaco lentamente e costantemente.

Iniezioni di Strensiq®

Rimuova l'ago, rilasci la pelle e appoggi delicatamente un batuffolo di cotone o una garza sul sito di iniezione per qualche secondo. Non massaggi la sede di iniezione dopo l'iniezione.

Iniezioni di Strensiq®



Rimuova l'ago, rilasci la pelle e appoggi delicatamente un batuffolo di cotone o una garza sul sito di iniezione per qualche secondo. Non massaggi la sede di iniezione dopo l'iniezione.

Iniezioni di Strensiq®

Se necessario, applichi un piccolo cerotto o una benda adesiva sul sito di iniezione.

Iniezioni di Strensiq®

Getti la siringa, il tappo e il flaconcino usati nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Getti la siringa, il tappo e il flaconcino usati nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Getti la siringa, il tappo e il flaconcino usati nel contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Iniezioni di Strensiq®

Se è necessaria una seconda iniezione per somministrare la dose prescritta, prenda un altro flaconcino di Strensiq e ripeta le precedenti fasi.

Iniezioni di Strensiq®

Registri tutte le informazioni relative all'iniezione sul diario o mediante altri strumenti.